



VASOCONSTRICCIÓN CEREBRAL REVERSIBLE



Farías, Eduardo Miguel
Tucumán – Argentina
Edufarias_3@hotmail.com



OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE

- Reconocer las consecuencias de dicha entidad como posible hallazgo incidental.
 - Describir las características imagenológicas en RMN.
- 




REVISIÓN DEL TEMA

- Los cambios fisiológicos y hemodinámicos que ocurren en el embarazo promueven un estado de hipercoagulabilidad relativa, mayor gasto cardíaco y una alteración del tono vascular que son necesarios para el crecimiento fetal y para evitar excesivas pérdidas sanguíneas durante el parto.
 - El embarazo y el puerperio son, por lo tanto, estados protrombóticos.
- 

REVISIÓN DEL TEMA

También conocida como angiopatía cerebral postparto, es una condición que se presenta con **hemorragia subaracnoidea no aneurismática, accidente cerebrovascular isquémico o hemorragia intracraneal.**







REVISIÓN DEL TEMA

- Fisiopatología: Todavía no se conoce bien la fisiopatología de esta entidad, pero se cree que el mecanismo subyacente es una alteración en el tono vascular cerebral que conduce a la vasoconstricción.
 - La asociación de esta entidad con aumento de la presión arterial, la ingestión de sustancias simpaticomiméticas y el feocromocitoma sugieren que existe una hiperactividad simpática.
 - Por otro lado, existe una superposición significativa entre los cuadros de RCVS (síndrome de vasoconstricción cerebral reversible) y el PRES (síndrome de encefalopatía posterior reversible) lo que apoya el papel de la disfunción endotelial.
- 



REVISIÓN DEL TEMA

- Clínica: cefalea en trueno, fotofobia, náuseas y vómitos.
- Está asociado a un cuadro de constricción vascular transitoria que puede tardar en resolverse hasta 3 meses.





REVISIÓN DEL TEMA

- Paciente de 24 años de edad
- Puerperio de 20 días.



REVISIÓN DEL TEMA

- Consulta por desorientación.
- Parestesia izquierda de una semana de evolución.





CONCLUSIONES

- Se concluye que esta entidad se da tanto en pre, intra o posparto, dependiendo de los antecedentes de la paciente.
 - Por ello hay que conocer la clínica para tener en cuenta, dicha entidad, entre los probables diagnósticos diferenciales.
- 



BIBLIOGRAFÍA

- <https://cbseram.com/2018/08/15/imagen-de-las-emergencias-neurovasculares-en-el-embarazo-y-el-puerperio/>
- 